

บรรณานุกรม

กาญจนา เอกปรัชญา. (2541). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดี่ยว ครบ 4 เดือน ในจังหวัดแพร่ , วารสารการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม, 21, 4-10.

จินตนา พัฒนพงศธร และศันสนีย์ เจตนาประยุกต์. (2546). อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดี่ยวอย่างน้อย 4 เดือน. รายงานการวิจัย : สำนักส่งเสริมสุขภาพเขต กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี.

ชญาดา เนตรกระจ่าง และคณะ.(2550). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดี่ยวนาน 6 เดือนหลังคลอดของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี. รายงานการวิจัย : โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี.

ธิติมา เงินมาก.(2548). ศึกษาอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดี่ยว 4-6 เดือนหลังคลอด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในมารดาที่คลอดครบกำหนดในโรงพยาบาลรามาริบัติ. รายงานการวิจัย : โรงพยาบาลรามาริบัติ กรุงเทพฯ.

เปรมฤดี ศรีวิชัย,พรนภา สุริยะไชย.(2558).ความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดี่ยวในมารดาวัยรุ่น 6 เดือนแรกหลังคลอด ที่โรงพยาบาลพะเยา.พะเยา.วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย.

ลักขณา กานติ และคณะ. (2559). การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 39, 12-18.

วรรณวิมล วิเชียรฉาย. (2549). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดี่ยวนาน 6 เดือนหลังคลอด ของหญิงที่มาฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า (รายงานผลการวิจัย).

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี.

ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย.(2551). นมแม่...ทุนสมองของลูกรัก. (พิมพ์ครั้งที่ 1). มปท.

สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ,มนตรี วังพฤกษ์.(2550).ทบทวนวรรณกรรม เรื่อง "นมแม่"ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย:การเรียกนมแม่กลับคืน(Relactation).กรุงเทพฯ.ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย. (2547). รายงานการวิจัยอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวน้อย 4 เดือน. กรุงเทพมหานคร.